

FAUNA HUILENSE

FASCÍCULO 2



INTRODUCCIÓN

Debemos sentirnos orgullosos y privilegiados porque el Huila nos ofrece una fauna silvestre que solo podemos encontrar en nuestros hermosos ecosistemas, por estar ubicado en una de las zonas más ricas en términos de diversidad biológica del país. Nuestra biodiversidad hace de nuestra región un paisaje estratégicamente bello, donde conviven especies animales diversas de Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios, algunas de las cuales son únicas o exclusivas de nuestra región (endémicas), gracias a la diversidad geográfica y climática.

Lamentablemente la supervivencia de algunas de estas maravillosas especies, se encuentran amenazadas o en peligro hoy en día, debido a la caza y comercialización (tráfico) ilegal, como también por el deterioro o destrucción de su hábitat natural. Para concientizar y preservar dichas especies, se han establecido categorías internacionales de conservación de las poblaciones naturales, que identifican el estado actual de cada especie, que se indican en este fascículo.



Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia



GLOSARIO

Categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza UICN

(EX) Extinta: Cuando no queda duda de que el último individuo de una especie existente está muerto.

(EW) Extinto en Vida Silvestre: Especies que sobreviven en cautiverio o como población (o poblaciones) completamente fuera de su distribución original.

(CR) En Peligro Crítico: Especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato.

(EN) En Peligro: Especies que están en alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.

(VU) Vulnerable: Especies con riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo.

(NT) Casi Amenazado: Especies que están cerca de ser clasificada para una categoría de amenaza en el futuro cercano.

(LC) Preocupación Menor: Especies abundantes y de amplia distribución.

(DD) Datos Insuficientes: Cuando la información disponible es inadecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción.

(NE) No Evaluado: Cuando todavía no ha sido clasificado en relación con los criterios.

Apéndices del CITES

Así mismo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES, establece un control del comercio (importación, exportación y re-exportación) de especies de la fauna y flora silvestre amenazadas de extinción, así como de sus productos. Consta de tres Apéndices:

Apéndice I: Especies en peligro de extinción y su comercio está prohibido, se requiere de permiso de importación y de exportación o certificado de re-exportación.

Apéndice II: Especies que pueden estar en peligro de extinción a menos que su comercio esté sujeto a reglamentación estricta. El comercio es permitido pero controlado.

Apéndice III: Especies que un país somete a regulaciones nacionales y que requiere de la cooperación de otros países para sus controles de comercio.

MAMÍFEROS

Los mamíferos son una clase de vertebrados que se caracterizan sobre todo porque las madres alimentan a sus crías a través de las mamas, lo que da origen a su nombre. Esto se debe a que al tratarse de animales complejos, necesitan estar más tiempo dependiendo de la madre, después de nacer, para adquirir conocimientos propios de su especie, claves para su supervivencia.

OSO DE ANTEOJOS

(Tremarctos ornatus)

Única especie de oso que habita en Sur América. La coloración del pelaje es uniforme, negra a excepción de una mancha blanca alrededor de los ojos y del pecho. Alcanza un peso de 200 kg y una longitud de 120-180 cm. Es omnívoro, aunque su dieta habitual es preferentemente de origen vegetal. Es de hábito diurno, generalmente solitario.

Categoría de Amenaza: VU y Apéndice I.



DANTA DE PÁRAMO

(Tapirus pinchaque)

De las cuatro (4) especies de dantas tapires que existen el mundo, solamente la Danta de Páramo habita en el Huila. Es un animal nocturno, herbívoro, de cuerpo robusto, extremidades posteriores con tres dedos y anteriores con cuatro, peso de 150 – 300 kg y longitud de 2 m.

Categoría de Amenaza: EN y Apéndice I.



VENADOS

De hábitos diurnos o nocturnos, terrestres, herbívoros y solitarios. Caracterizados por su corta cola, patas estilizadas y delgadas, pelaje café-grisáceo, cuernos ramificados o sin ramificaciones, peso desde 50 a 10 Kg, longitud desde 130 a 45 cm de largo. Se



Venado de Cola Blanca

alimentan de hojas, retoños, frutos y semillas. Encontramos tres especies: Venado de cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Venado rojo (*Mazama sp.*), VU, en Apéndice III. y Venado conejo (*Pudu mephistopheles*). EN y Apéndice II.

PEREZOSO DE DOS UÑAS


(*Choloepus hoffmanni*)



De pelaje entre crema y café, especie nocturna, solitaria y arbórea, de peso entre 5.5 kg – 10 kg y longitud 52 -70cm. Categoría de Amenaza: LC y Apéndice II.

FELINOS

De hábitos nocturnos, carnívoros y solitarios. Encontramos al Jaguar (*Panthera onca*) que es el felino más grande de América, pudiendo medir hasta 80 cm de altura y pesar hasta 120 kg. Vive en bosques y selvas, cerca de ríos y pantanos, siendo un buen nadador; El Puma (*Puma concolor*), de pelaje canela o café, peso 29-120 kg y longitud 143 cm y también



Puma

felinos pequeños como el Ocelote o

Tigrillo (*Leopardus pardalis*), de pelaje vistoso de color amarillo-pardo, con rayas y pequeñas manchas negras a lo largo del dorso. Todas estas especies están categorizadas como: VU y Apéndice I del CITES.



Ocelote y/o Tigrillo

GUARA

(*Dasyprocta punctata*)

Diurno, herbívoro de pelaje café rojizo, amarillo ó gris, peso entre 3.2-4.2 kg y longitud entre 41 y 66cm. Categoría de Amenaza: LC y Apéndice III.



NUTRIA DE RÍO

(*Lontra longicaudis*)

Diurno, semiacuático, solitario y carnívoro. De color pardo canela-grisáceo, peso 5-15 kg y longitud 53-80 cm. Categoría de Amenaza VU y Apéndice I.



MONOS O MICOS

Diurnos, arborícolas, de cola prensil y viven en grupos de hasta 20 - 30 individuos. Entre las variedades de monos en el Huila podemos destacar al Marteja (*Aotus sp.*), único mono nocturno, de pelaje café claro con manchas blancas en los ojos; el Mono Aullador (*Alouatta seniculus*); y el Mono Churuco (*Lagothrix lagotricha*), el más común, de pelaje gris plateado y cara negra. Todas estas especies están categorizadas como: VU y Apéndice II.



Marteja



Mono Churuco



PACARANA

(*Dinomys branickii*)

Roedor de pelaje café oscuro o negro con manchas blancas, peso 13-15 kg, longitud 73 a 80 cm. Categoría de Amenaza: VU y Apéndice II.



Huila predominan el Perico Real (*Brotogeris jugularis*), de plumaje verde con pequeña mancha en el cuello y el Perico Chocoloro (*Aratinga wagleri*), de plumaje verde con frente roja. No se encuentran reportadas por la UICN, pero están dentro del Apéndice II del CITES. También algunas especies raras como Perico De Los Nevados (*Bolborhynchus ferrugineifrons*) y Perico Paramuno (*Leptosittaca branickii*) categorizados como VU.



BORUGO

(*Agouti paca*)

Roedor nocturno, pelaje castaño rojizo con manchas blancas, peso 5-13 kg, longitud 60-79 cm. Categoría de Amenaza: LC y Apéndice III.



COTORRA MAICERA

(*Pionus chalcopterus*)

Diurna, arbórea, que forman grupos de 5-20 ejemplares, plumaje azul parduzco. No se encuentra reportada por la UICN, pero están dentro del Apéndice II del CITES.



CUSUMBO

(*Nasua nasua*)

Diurno, omnívoro, pelaje pardo y cola con anillos, peso de 3 – 7.2 kg, longitud de 41-67 cm. No está dentro de las categorías de la UICN pero está en el Apéndice III del CITES.



GUACAMAYA VERDE

(*Ara militaris*)

De gran tamaño y robusto, de color verde bien vivo, con frente roja, cola con plumas rojas y azules. categorizada como Vulnerable VU por la UICN y Apéndice I del CITES.



AVES DEL HUILA

El Huila es una tierra pródiga en aves de varias formas, tamaños, coloridos, cantos y sonidos. En nuestra región encontramos una variedad de especies, muchas en vía de extinción.

PERICOS

Aves diurnas de tamaño pequeño que forman grupos hasta de 50 ejemplares. En el

CARRIQUÍES

Existen 2 variedades: El Carriquí de Montaña (*Cyanocorax incas*), de abdomen amarillo, dorso, alas y cola verde y cresta azul; y el Carriquí Pechiblanco (*Cyanocorax affinis*), de cabeza y cuello negro y abdomen blanco. No se encuentran reportadas por la UICN y el CITES.



PAVAS DE MONTE Y GUACHARACAS

Arborícolas, diurnas y territoriales. Tenemos la Pava Maraquera (*Chamapaetes goudotti*), de plumaje café oliva oscuro, longitud de 64 cm y La Guacharaca (*Ortalis Sp.*), de plumaje gris pizarra en la cabeza, dorso cuello y gris claro o blancuzco en el vientre. Se le ve en grupos de 6 a 20 individuos. No se encuentra reportada por la UICN y el CITES.



LECHUZAS Y BUHOS

Nocturnas, solitarias que se alimentan de presas. Tenemos: La Lechuza (*Tito alba*), de plumaje blanco en cuerpo y parte superior de alas dorado y gris, cara en forma de corazón; el Búho Rayado (*Rhinoptynx clamator*), el Búho Orejudo (*Asio stygius*) y el Currucutú (*Otus choliba*), de plumaje barrado. No se encuentran reportadas por la UICN, pero están dentro del Apéndice II del CITES.



TOCHE

(*Icterus chrysater*)
Diurna, solitaria o en bandadas, de vuelo fuerte y rápido, plumaje amarillo, cuello, alas y cola negro. No se encuentran reportadas por la UICN y el CITES.



TANGARA REAL

(*Tangara cyanicollis*)
Diurna de color negro y turquesa con las alas de color verde brillante, cola de color café oscuro. Puede encontrarse solo o en parejas. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



GALLITO DE ROCA

(*Rupicola peruviana*)
Diurna y omnívora. De plumaje rojo claro o rojo anaranjado, alas y cola negra, y cresta pequeña. No se encuentran reportadas por la UICN, pero están dentro del Apéndice II del CITES.



AZULEJO

(*Thraupis episcopus*)
Ave diurna y solitaria, plumaje en partes dorsales azules oscuras, partes inferiores color gris azulado claro. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



LA MIRLA

(*Mimus gilvus*)
Diurna, solitaria, de plumaje gris opaco, cola larga delgada con la punta blanca. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



CARDENAL

(*Ramphocelus carbo*)
Ave diurna, que se alimenta de granos e insectos. Cuerpo de color rojo, cabeza y alas más oscuro ó negro. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



CARPINTERO BUCHIPECOSO

(*Chrysomitris punctigula*)

Plumaje amarillo oliva y barrado, frente negra y coronilla roja. Ave diurna, se alimenta de granos e insectos. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



HALCONES

Rapaces solitarias y hábitos diurnos. Se destacan 3 especies: El Halcón Cara Cara (*Polyborus plancus*): parte superior de la cabeza negruzca, el resto de la misma y el cuello blanco grisáceo, y el dorso y pecho barrado; el Halcón Garrapatero (*Milvago chimachima*), de plumaje amarillo y alas marrón; y el Halcón Gris (*Buteo magnirostris*) de cabeza y dorso gris parduzco, pecho y vientre barrado. No se encuentran reportadas por la UICN y el CITES.



BARRANQUERO

(*Momotus momota*)

Plumaje verde, azul y negro; muy reluciente y tornasolado. Mide aproximadamente 41 cm. y pesa 120 gr. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



ÁGUILA PESCADORA

(*Pandion haliaetus*)

Rapaz grande (55 cm, 150 a 180 cm de envergadura), especializado en atrapar peces en picada. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



GARZAS

Se mantienen en las orillas de los depósitos y cursos de agua dulce y de poca profundidad.

Solitaria y en agrupaciones considerables.

Predominan 3 especies de garzas: La Garza Rayada (*Butorides striatus*), es grisácea con coronilla negra, la Garza Blanca (*Egretta alba*) y la Garza Bueyera o Garza Del Ganado (*Egretta thula*), la más común, que vemos tras el ganado.



CÓNDOR DE LOS ANDES

(*Vultur gryphus*)

De plumaje negro y collar de plumas blancas en la base del cuello, longitud de 100-120 cm, peso alrededor de 11.5 kg, machos con carúncula parduzca en la frente. Se encuentra reportado En Peligro (EN) por la UICN y está en el Apéndice I del CITES.



TUCANETA ESMERALDA

(*Aulacorhynchus prasinus*)

Diurna, silenciosa, de vuelo corto. Color verde brillante y cuello gris, pico negro con amarillo. No se encuentra reportada por la UICN y el CITES.



REPTILES

Se estima que hace unos 310 millones de años descendieron de los anfibios, pero no de los anfibios modernos de hoy en día sino de otras especies de anfibios que vivían en la tierra hace millones de años. Con el transcurso del tiempo los mamíferos y las aves surgieron a su vez de los reptiles.

De las 7.000 especies de reptiles que viven hoy en día, algunas habitan en nuestra región.

COCODRILO DEL MAGDALENA

(*Crocodylus acutus*)

De hábitos nocturnos, ovíparo, acuático, gregario y territorial; piel con escamas y longitud entre 2-5 m. Está categorizado por la UICN En Peligro Crítico (CR) y por el CITES en Apéndice I.



TORTUGA CHARAPA

(*Podocnemis lewyana*)

Acuática, diurna, omnívora y vive en pequeños grupos. Categoría de Amenaza: EN y Apéndice II.



TORTUGA MORROCOY

(*Geochelone sp*)

Diurna, solitaria, terrestre, herbívora, caparazón de color marrón oscuro con círculos más claros o amarillos, longitud de 30-35 cm. Categoría de Amenaza: EN y Apéndice II.



TORTUGA TAPACULO

(*Kinosternum sp*)

Acuáticas, diurnas, omnívoras y viven en pequeños grupos. Está categorizado por la UICN como Vulnerable VU según la UICN y en Apéndice II del CITES.



IGUANA

(*Iguana iguana*)

Diurna, ovípara, herbívora, arborícola, territorial, solitaria, de color verde, cuerpo recubierto de escamas, peso de 4-8 kg y longitud de 1.2-1.8 m. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



SERPIENTES

En el Huila abundan las serpientes, algunas NO son venenosas como la Serpiente Toche (*Spilotes pullatus*), especie diurna, muy veloz, generalmente arborícola, y ovípara.

Otras por el contrario son muy venenosas como la Serpiente Cascabel (*Crotalus sp*)



y la Coral Rabo de Aji (*Micrurus mipartitus*) y la Serpiente Talla X (*Botrox asper*). Nocturnas, terrestres, de colmillos inoculadores de veneno.



Ninguna de estas especies se encuentra en las categorías de la UICN y del CITES.

algunas plantas. Se encuentra en la categoría LR y Apéndice II.

SAPO ARLEQUIN NEGRO

(Atelopus ebenoides marinkellei)

Pequeño sapo de 48 mm de piel rugosa de color negro con pequeñas manchas amarillas por todo el cuerpo sino mas grandes en el vientre. Posee tuberculos en toda la piel del dorso. Posee extremidades cortas y palmeadas. Se encuentra en Peligro critico CR.



BOA

(Boa constrictor)

Hábito nocturno y solitario, ovovivípara, no venenosa, peso de 10-20 kg y longitud de 4 m. No se encuentra reportada por la UICN, pero está dentro del Apéndice II del CITES.



ANFIBIOS

Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. Se estima que surgieron de los peces hace unos 360 millones de años. En diferencia a los otros vertebrados, los anfibios se distinguen por sufrir una transformación total durante su desarrollo. A este cambio de forma se le llama metamorfosis. Se estima que unas 4300 especies diferentes de anfibios viven hoy en día. Dentro de los anfibios sobresalen las ranas y sapos, de los cuales en el Huila tenemos algunas especies:

RANA FLECHA VENENOSA

(Dendrobates truncatus)

Ranita pequeña de 25 mm de longitud, de color negro con vetas amarillas. Son diurnas y solitarias las hembras ponen sus huevos en los charcos de agua que se forman en las hojas de

